

Lorsque le praticien suspecte une douleur neuropathique chez un patient adulte, le questionnaire DN4 est utile comme outil de confirmation du diagnostic. Attention, ce score n'a pas été élaboré pour mesurer l'intensité de la douleur neuropathique, ni pour en faire le suivi sous traitement, il sert à confirmer une probable composante neuropathique à la douleur.

Ce questionnaire se répartit en 4 questions représentant 10 items à cocher :

- Le praticien interroge le patient et remplit le questionnaire
- À chaque item, le patient doit apporter une réponse "oui" ou "non".
- À la fin du questionnaire, le praticien comptabilise les réponses, 1 pour chaque "oui" et 0 pour chaque "non".
- La somme obtenue donne le Score du patient, noté sur 10.

SI LE SCORE EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 4/10, LA DOULEUR NEUROPATHIQUE EST PROBABLE (SENSIBILITÉ À 82,9% ET SPÉCIFICITÉ 89,9%)

QUESTION 1 : La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

	Oui	Non
1. Brûlure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Sensation de froid douloureux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Décharges électriques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTION 2 : La douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs symptômes suivants ?

	Oui	Non
4. Fourmillements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Picotements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Engourdissements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Démangeaisons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTION 3 : La douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence :

	Oui	Non
8. Hypoesthésie au tact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hypoesthésie à la piqure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTION 4 : La douleur est-elle provoquée ou augmentée par :

	Oui	Non
10. Le frottement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>